

**Esquema de Vacunación Trabajadores
PAI – ECOPETROL**

GRUPO	VACUNAS	DOSIS	ENFERMEDADES PREVENIBLES	VIA DE APLICACIÓN
Trabajadores en General	Anti influenza	Monodosis Repetir cada año	Influenza	Subcutánea Tercio superior, brazo
	Refuerzo Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td)	Mujeres: Esquema descrito en el cuadro del esquema general. Hombres: esquema será de dos dosis (con intervalo de 4 semanas), con refuerzo cada 10 años *	Difteria, Tétanos	Subcutánea Tercio superior, brazo
Trabajadores que laboran o visitan Áreas Endémicas ¹ : Antioquia, Bogotá, Chocó, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander y Valle del cauca.	Fiebre Tifoidea	1 dosis única Refuerzo a los 2 años si está en zona endémica	Fiebre Tifoidea	Subcutánea/Intra muscular Tercio superior, brazo
Trabajadores que laboran o visitan Áreas Endémicas ¹³ : Los departamentos de Amazonas, Caquetá, Casanare, Cesar, Guainía, Guaviare, Guajira, Meta, Putumayo, Vaupés, Vichada, Arauca todos los municipios. Magdalena: Santa Marta, Ciénaga y Aracataca. Norte de Santander, zona del Catatumbo: Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama, Sardinata, Tibú, El Zulia, Hacarí y San Calixto. Chocó: Rio Sucio, Carmen del Darién, Acandí, Jurado, Nuquí y Unguía. Antioquia: Dabeiba, Mutatá, Turbo y Yondó. También se consideran zonas de alto riesgo los parques naturales.	Antiamarilica**	Monodosis Dosis Única ² .	Fiebre Amarilla	Subcutánea Tercio superior, brazo
Trabajadores que laboran o visitan Áreas Endémicas ¹³ : Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Choco, Huila, La guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés	Hepatitis A	1ra Dosis 2da dosis a los seis meses de la primera	Hepatitis A	Intramuscular

¹ Informe INS, según consulta realizada mayo de 2015

² Ídem 13

Trabajadores con cargos de Control de emergencias y Brigadistas	Hepatitis B	3 dosis con Esquema 0 - 1 - 6 2da Dosis al mes de la 1ra 3ra Dosis a los 6 meses de la 1ra	Hepatitis B	Intramuscular, deltoides
Trabajadores Salud con contacto con fluidos corporales y/o atención de pacientes	Difteria, Tétanos y Tosferina Acelular (DPaT)	Única dosis	Difteria, Tétanos y Tosferina	Intramuscular, deltoides
	Hepatitis B	3 dosis con Esquema 0 - 1 - 6 2da Dosis al mes de la 1ra 3ra Dosis a los 6 meses de la 1ra	Hepatitis B	Intramuscular, deltoides
Trabajadores viajeros fuera del país Brasil - Perú - Golfo México	Fiebre Tifoidea	2 dosis: El refuerzo a los 3 años de la 1ra dosis	Fiebre Tifoidea	Subcutánea/Intramuscular
	Hepatitis A	Primera Dosis Segunda dosis a las seis semanas de la primera	Hepatitis A	Intramuscular
	Anti amarilica**	Monodosis Dosis Única ³ .	Fiebre Amarilla	Subcutánea Tercio superior, brazo
Trabajadores mayores de 18 años de edad	Anti Covid-19 Sinovac Life Sciences CO Ltd denominada CoronaVac	2 dosis: 1 d: dosis inicial 2: 28 días de la 1d Refuerzo***:	Infección respiratoria SARS-CoV2-Covid 19	Intramuscular Tercio superior del brazo
	Anti Covid-19 Moderna ARNm-1273, Switzerland GmbH	1 Rf: 4 meses de la 2d 2 Rf***: 4 meses del 1 Rf.		
	Anti Covid-19 Pfizer Inc y BioNTech	2 dosis: 1d: dosis inicial 2 d***: 21 días de la 1d Refuerzo***:		
	Anti Covid-19 ChAdOx1-S recombinante o AZD1222 de Laboratorio AstraZeneca	2 dosis: 1 d: dosis inicial 2 d***: 12 semanas de la 1d Refuerzo***:		
	Anti Covid 19 Janssen COVID-19 de Johnson & Johnson	Esquema inicial: 1 dosis única Refuerzo***:		
		1 Rf: 4 meses de la 2d 2 Rf***: 4 meses del 1 Rf		

³ Ídem 13

* Ver en pág. 26 Pautas de vacunación en caso de vacunación incompleta frente al tétanos

** Todos los trabajadores que van a viajar a zona endémica o fuera del país debe tener la vacuna de fiebre amarilla con su respectivo carné internacional. Se debe aplicar 10 días antes de iniciar el viaje a zona endémica o internacional.

*** Las segunda dosis y refuerzos del esquema se podrán administrar de forma combinada, revisar apartado 2.9.p Covid19